

NOVALAC

NOVARICE

	/100ml	Novalac NovaRice
Energie	kcal	66
Eiwit equivalent	g	1,8
Caseïnen	%	0
Melkwei-eiwitten	%	0
Rijsthydrolysaat	%	100
Lipiden	g	3,3
Linolzuur	g	0,6
α-linoleenzuur	mg	55
DHA(Docosahexaeenzuur)	mg	16
ARA(Arachidonzuur)	mg	4
Koolhydraten	g	7,3
Lactose	%	0
Dextr.-maltose	%	75,4
Zetmeel	%	20,9
Mineralen		
Natrium	mg	30
Kalium	mg	73
Chloor	mg	53
Calcium	mg	59
Fosfor	mg	40
Magnesium	mg	5,9
Ijzer	mg	1
Zink	mg	0,4
Koper	mg	0,05
Mangaan	mg	0,005
Fluor	mg	<0,06
Seleen	µg	2,9
Chroom	µg	<5,9
Molybdeen	µg	<5,9
Jood	µg	13
Vitaminen		
A	µg	73
D	µg	1,6
E	mg	1,1
K	µg	4
C	mg	7,9
Thiamine	mg	0,11
Riboflavine	mg	0,2
Niacine	mg	0,6
B6	mg	0,08
Foliumzuur	µg	11
Folaten	µg-EFA	18
B12	µg	0,2
Biotine	µg	2
Pantotheenzuur	mg	0,7
Choline	mg	22
Inositol	mg	10,6
Taurine	mg	5,3
L-carnitine	mg	2,6
Nierbelasting	mOsm/l	160,5
Verdunning	%	13,2

1 maatje in 30 ml water

ALLERGIE

Allergieën worden opgewekt door baby's in contact te brengen met allergenen. Koe- en sojaproteïnen zijn bekende allergenen. Een exclusiedieet is de sleutel in de behandeling van een voedselallergie.

NOVALAC NOVARICE

Door als proteïnebron een sterk doorgedreven rijsthydrolysaat te gebruiken, heeft Novalac NovaRice een lage residuele allergeniciteit^(4*)

AANGEPASTE SAMENSTELLING

- Rijst als proteïnebron. Rijst bevat zo goed als geen allergenen en is zeer voedingsrijk.
- Het hypo-allergene profiel van rijst wordt geoptimaliseerd door een sterk doorgedreven hydrolyse van de proteïnen.
- Het aminozurenprofiel wordt geoptimaliseerd door de toevoeging van lysine en threonine.
- Bevat geen fyto-oestrogenen.
- Bevat geen lactose.
- Bevat geen sucrose.
- Heeft een betere smaak dan koemelkhydrolysaten⁽¹⁾
- De toevoeging van maïszetmeel beperkt het risico op regurgitaties en stoelgangproblemen als gevolg van de hydrolyse van de eiwit equivalent.⁽⁴⁾

BEWEZEN DOELTREFFENDHEID

- Conform de richtlijnen, goede tolerantie bij meer dan 90% van de kinderen met een bewezen koemelkeiwitallergie (95% CI)⁽²⁾
- Normalisatie van de groeicurves & de BMI⁽²⁾
- Significante daling van het aantal regurgitaties⁽²⁾
- Leidt sneller tot een tolerantie aan koemelk dan een hydrolysaat van koemelk of soja⁽³⁾



CNK-code	Product	Van - tot
4614-574	Novalac NovaRice 800 g	0 – 36 maand

Informatie exclusief bestemd voor artsen, apothekers en paramedisch personeel die worden betrokken bij de opvolging van zuigelingen en jonge kinderen. Belangrijke opmerking: moedermelk is de ideale voeding voor zuigelingen. / BE-NOV-10/2023- Line 1.3.5. - (Compendium Sp1) - v1 NL



(1) Pedrosa M, Pascual CY, Larco JI et al. Palatability of hydrolyzates and other substitution formulae for cow's milk-allergy children: a comparative study of taste, smell, and texture evaluated by healthy volunteers. J Investig Allergol Clin Immunol.2006 ;16 :351-6
(2) Vanderplas Y, et al., Eur J pediatr 2014; 173:1209-1216
(3) Terracciano L, Bouggue GR, Serratil T et al. Impact of dietary regimen on the duration of cow's milk allergy : a random allocation study. Clin Exp Allergy. 2010 ;40 :637-642
(4) Bocquet et al., Archives de Pédiatrie 2020;26:238-246
* Rice is considered the least allergenic cereal because it triggers undesirable reactions in less than 1% of children with allergies.
CI: Confidence interval / BMI: Body mass index